

**NOTA DE PRENSA**

***11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata***

**UNOS 6.000 HOMBRES SERÁN DIAGNOSTICADOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN ANDALUCÍA ESTE AÑO, UN TUMOR CUYA SUPERVIVENCIA ALCANZA YA EL 90% DE LOS CASOS**

- Se trata del tumor más frecuente en los hombres en España, por delante del colorrectal, de pulmón y vejiga, y cuenta con una de las mayores tasas de mortalidad por cáncer en la población masculina, sólo por detrás del de pulmón y el colorrectal
- En nuestra comunidad, más de 5.900 hombres fueron diagnosticados con cáncer de próstata el año pasado y se estima que fallecieron cerca de un millar de hombres por este tipo de tumor
- No obstante, los nuevos tratamientos y avances oncológicos que se están consiguiendo en los últimos años están logrando mejorar el diagnóstico, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, y casi un 90% de los pacientes afectados logrará superarlo
- Destaca el alto nivel de excelencia de la oncología andaluza en este campo, con hospitales que son una referencia en el tratamiento de estos tumores, tanto en la aplicación de las terapias más avanzadas como en el desarrollo de ensayos clínicos cuyos resultados ya están abriendo una esperanza para el futuro
- El cáncer de próstata se desarrolla principalmente en varones de edad avanzada, y sus principales factores de riesgo son la edad, y en menor medida, la historia familiar por cuestiones de tipo hereditario, por lo que los expertos de la SAOM aconsejan consultar a su médico de familia ante cualquier síntoma o si tiene esta condición

**Jueves, 11 de junio de 2026-** Más de 5.900 hombres fueron diagnosticados de cáncer de próstata el año pasado en Andalucía, con una prevalencia que alcanza los 25.000 casos, según los datos que maneja la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM),

que con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, quiere informar de los últimos datos sobre este tumor en nuestra comunidad y de los últimos tratamientos y avances oncológicos que se están logrando en los últimos años en este ámbito, que están logrando mejorar el diagnóstico, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con este tipo de tumor.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres en España, por delante del colorrectal, de pulmón y de vejiga, y cuenta con una de las mayores tasas de mortalidad por cáncer en la población masculina en España, sólo por detrás del de pulmón y el colorrectal, según el informe 'Las cifras del cáncer en España' de la Sociedad Española de Oncología Médica. En Andalucía se estima que fallecieron un millar de hombres por este tipo de cáncer en 2025.

El cáncer de próstata es una enfermedad que se desarrolla principalmente en varones de edad avanzada. Se trata del segundo tipo de tumor más prevalente en España (con casi 260.000 pacientes), sólo por detrás del cáncer de mama, y representa una quinta parte de los nuevos tumores que se diagnostican al año a la población masculina. En nuestro país se prevé más de 34.000 nuevos casos de cáncer de próstata en 2026, unos 6.000 de ellos, en Andalucía, y se estima que su incidencia seguirá aumentando en los próximos años.

“A pesar de este crecimiento, debido en buena parte a que también se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz y el aumento de la esperanza de vida, los niveles de supervivencia son muy altos en los pacientes con cáncer de próstata, situándose en casi el 90%. Gracias a los nuevos avances en los tratamientos y las terapias innovadoras se está aumentando la supervivencia y la calidad de vida de las personas con este tipo de tumor, hasta el punto de que la supervivencia neta a los cinco años ha crecido un 20% en los últimos años”, señala la Dra. Rosa María Villatoro, coordinadora del Grupo de Tumores Genitourinarios de la SAOM y oncólogo del Hospital Costa del Sol de Marbella.

En Andalucía, como en el resto de España, los principales afectados son los hombres mayores de 60-65 años, si bien el riesgo de desarrollarlo puede empezar a partir de los 50 años y puede detectarse a partir de esa edad gracias al diagnóstico precoz. La evolución que ha habido en el tratamiento del cáncer de próstata en los últimos años ha sido importante, y destaca el alto nivel de excelencia de la oncología andaluza en este campo, con hospitales que son una referencia en el tratamiento de estos tumores, tanto en la aplicación de las terapias más avanzadas como en el desarrollo de ensayos clínicos cuyos resultados ya están abriendo una esperanza para el futuro.

Para la Dra. Villatoro, “la oncología de precisión, los nuevos fármacos y tratamientos, y los ensayos clínicos son los grandes pilares que están posibilitando una nueva forma de abordar los tumores, con terapias más avanzadas y personalizadas, también en el cáncer de próstata”, afirma. Asimismo, la colaboración multidisciplinar entre distintas especialidades (oncólogos médicos y radioterápicos, urólogos, médicos de Medicina

Nuclear, patólogos, radiólogos, especialistas de Farmacia Hospitalaria. o médicos de Atención Primaria) está contribuyendo notablemente a ese avance en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumores.

Entre los principales factores de riesgo del cáncer de próstata, además de la edad, se encuentra la historia familiar por cuestiones de tipo hereditario -aquellos hombres con un familiar de primer grado con este cáncer tienen más probabilidad de desarrollarlo, aunque tan sólo un 5-10% de estos tumores tienen un componente hereditario-.

En este sentido, los oncólogos médicos aconsejan que aquellos hombres que presenten algún síntoma de la enfermedad, especialmente si tienen o han tenido familiares directos con este tipo de cáncer, consulten a su médico de familia para realizarse una revisión. Entre los síntomas se destacan, en las primeras fases del tumor, la disminución del calibre o interrupción del flujo de orina; el aumento de la frecuencia de la micción; la dificultad para orinar o escozor durante la micción o la sensación de micción incompleta.

Los expertos de la SAOM, no obstante, señalan que en la mayoría de las ocasiones, estos síntomas son secundarios a la hiperplasia benigna de próstata, mucho más habitual y completamente benigna. En las fases más avanzadas, los síntomas pueden incluir la aparición de sangre en la orina o signos de infección, aunque son poco frecuentes.

**Para más información:**

**Gabinete de comunicación de la SAOM: Tomás Muriel (605 603 382)**